

Nieuw



ZooLac[®] MULTI PASTE[®]


Stabiliseert de spijsvertering en onderhoudt het evenwicht van de darmflora.

ZooLac[®] MULTI PASTE[®] bevat vinasse (een microbiel bijproduct van thermostabiele *Lactobacillus acidophilus*), het kleimineraal zeoliet (clinoptiloliet) én gistcelwandfragmenten. Hierdoor bindt het schadelijke bacteriën en hun gifstoffen, evenals grote hoeveelheden vocht en draagt zo bij aan een vaste darminhoud.

5 effecten in één toepassing!


- Bindt vocht in de darmen waardoor de darminhoud vaster wordt
- Bindt schadelijke bacteriën en hun toxines zodat deze onschadelijk worden
- Ondersteunt de groei van nuttige bacteriën in de darmflora, zodat deze sterker worden dan de schadelijke bacteriën
- Het stimuleert de immuunsysteem van het dier in de darmen, waardoor het dier zelf bijdraagt aan de bestrijding van schadelijke bacteriën
- Beschermt de darmen tegen aanhechting van schadelijke bacteriën

ZooLac[®] MULTI PASTE[®] kan worden toegediend in combinatie met antibiotica.




Hoe werken pathogenen?


Cytokineproductie



Aantasting van enterocyten




Virus



De werking van

ZooLac[®] MULTI PASTE[®]



Adhesie is noodzakelijk ter bescherming tegen pathogenen.

Nieuw



Instructies voor gebruik:

ZooLac[®] MULTI PASTE[®] wordt toegediend door middel van een gebruiksvriendelijke spuit, die tevens dient als verpakking van het product. Voorafgaand aan de toediening de spuit instellen op de benodigde hoeveelheid en vervolgens de paste op de tong van het dier plaatsen. **ZooLac[®] MULTI PASTE[®]** kan eventueel ook gemengd worden onder het voer.

De toediening is eenvoudig omdat **ZooLac[®] MULTI PASTE[®]** een aangename smaak heeft. Het product dient bij normale kamertemperatuur te worden bewaard. Indien bewaard in de koelkast, moet het product eerst op kamertemperatuur worden gebracht alvorens het wordt toegediend.

Natuurlijk product:

ZooLac[®] MULTI PASTE[®] is een natuurlijk product dat niet overgedoseerd kan worden. Bij acute diarree is aan te raden de eerste dosis te verdubbelen. Daarna om de 12 uur toedienen tot de ontlasting volledig normaal is.

Dosering:

Dosering volgens de tabel (2-3 maal daags)

Gewicht	Dosering
0-10 kg	1 mL
10-25 kg	2 mL
25-50 kg	3 mL

